

Dicas de acompanhamento e tratamento do cão com LVC


Recomendações baseadas no grupo BRASILEISH

LVC


Leishmaniose Visceral Canina



Estadiamento



O QUE FAZER?



1 Estágio 01 (4-6 meses)

- Animal suspeito de LVC
- Não tratar com drogas
- Ir para Imunoterapia em dose dupla, reforço a cada 6 meses.
- Vacinas anti-LVC (Leish-Tec®) em dose dupla cada 21d/ 3 adm./repetir a cada 4-6 meses

- Ir para Imunoterapia em dose dupla, reforço a cada 6 meses.
- + Miltefosina - Milteforan® (2mg/kg/sid/ por 28d)
- + Alopurinol (10 a 20 mg/kg por 2xdia), ad eternum ou por longo período (≥12-18meses)

Fica a critério do Médico Veterinário avaliar a necessidade de associar outras drogas:

- Domperidona (0,5 a 1,0 mg/kg 2 X dia por 30 dias);
- Prednisona/Prednisolona: 0,5-1mg/kg/sid/30d + 30d alternados (até subir albumina e abaixar globulina);
- Marbofloxacin - (quinolona de 3ª geração -2mg/kg/sid/ por 28d)

2 Estágio 02

3 Estágio 03

- Prognóstico bom, sem lesão renal.
- Miltefosina - Milteforan® + Alopurinol (Fica a critério do Médico Veterinário avaliar a necessidade de associar outras drogas como:
- Domperidona, Prednisona/Prednisolona, Marbofloxacin.

- Tem lesão renal, então, tem de tratar :
 - Leishmaniose + Função Renal.
 - Miltefosina - Milteforan® + Alopurinol + Domperidona.
- (Fica a critério do médico veterinário a necessidade de associar Dexametasona)
- A doença renal é irreversível.
 - Caso tenha Anemia, geralmente é imunomediada e irreversível

4e5 Estágio 04e05